

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE ACIDO MEFENAMICO COMPRIMIDOS 500MG

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene Información Importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al Indicado por su médico.

### COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Cada comprimido contiene:

Ácido mefenámico 500,00 mg

Excipientes: Croscarmelosa sódica, Povidona, Lauril sulfato de sodio, talco.

**Presentación:** 1X10 TAB

### CLASIFICACIÓN:

Analgésico, Antiinflamatorio no esteroidal

**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral

### INDICACIONES:

Tratamiento de dolores leves a moderados de variada etiología y alivio sintomático de la dismenorrea primaria y post-inserción del DIU.

### ADVERTENCIAS:

- **Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica**
- La administración por más de una semana debe ser con control médico.
- El tratamiento debe realizarse con la dosis más baja posible, especialmente si existen antecedentes de problemas renales o hepáticos.
- El paciente debe evitar la automedicación con analgésicos y fármacos reductores de la fiebre mientras este en tratamiento con este producto.
- Discontinúe inmediatamente este medicamento y consulte a su médico si aparece diarrea.

### CONTRAINDIACIONES: No usar en (a menos que su médico indique lo contrario):

- Antecedentes de pólipos nasales, broncoespasmos o reacciones alérgicas o de hipersensibilidad inducido por ácido mefenámico, ácido acetilsalicílico u otros analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (por ejemplo: ibuprofeno, diclofenaco, piroxicam, etc).
- Antecedentes de hipersensibilidad o alergia a algún componente de la fórmula.
- Úlcera gastrointestinales
- Insuficiencia hepática severa.
- Insuficiencia renal severa.
- Embarazo y lactancia.
- Niños menores de 14 años.

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE ACIDO MEFENAMICO COMPRIMIDOS 500MG

**INTERACCIONES:** El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de los siguientes casos:

Diuréticos (ej: furosemida, hidroclorotiazida, triamtereno, etc.), medicamentos para tratamiento de la presión alta, colchicina, corticoides (ej: betametasona, prednisona, etc.), glucósidos cardiotónicos (ej: digoxina), litio, metotrexato, paracetamol, ácido acetilsalicílico, otros antiinflamatorios no esteroideos (ej: ibuprofeno, diclofenaco, piroxicam, etc.), suplementos de potasio, hipoglicemiantes orales (ej: clorpropamida, glibenclamida, tolbutamida, metformina, etc.), insulina, heparina, anticoagulantes (por ejemplo acenocumarol), antiagregantes plaquetarios (por ejemplo ticlopidina), trombolíticos, ácido valproico, cefamandol, cefoperazona, cefotetan, ciclosporina, sales de oro, plicamicina, probenecid, antimicóticos (medicamentos contra los hongos).

### **PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES:**

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos.

**Ud. debe comunicar a su médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes:**

Alcoholismo, problemas de coagulación, enfermedades del sistema digestivo, úlceras digestivas, diabetes mellitus, enfermedades hepáticas o renales, enfermedades respiratorias o nasales de cualquier tipo, lupus sistémico, anemia, epilepsia, retención de líquido (hinchazón de pies o pantorrillas), enfermedades cardíacas, presión alta, bajo recuento plaquetario o de glóbulos blancos, polimialgia reumática, porfiria, artritis temporal, úlceras, lesiones o manchas blancas en la boca, inflamación de encías, antes o después de intervenciones quirúrgicas (incluyendo los procedimientos dentales).

### **EFFECTOS ADVERSOS (no deseados):**

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

**Discontinúe el uso de este producto y consulte inmediatamente al médico si presenta algunos de los síntomas siguientes:**

Diarrea, ardor o molestias abdominales; vómitos de aspecto café o con sangre, calambres abdominales; sangre en deposiciones o en flema; rinorrea (sangre de nariz) sin explicación; erupción de la piel; irritación de la mucosa bucal; irregularidades menstruales o sangramiento vaginal; edema (hinchazón en cualquier parte del cuerpo); cualquier alteración urinaria, como por ejemplo cambios en el color de esta, o si se presenta turbia, dolor al orinar y/o sensación frecuente de orinar, cambios en la cantidad de orina, etc.; desmayos; alteraciones respiratorias o del pulso cardíaco; tos; convulsiones; fiebre; sangramiento exagerado de cortes y heridas; tinnitus (sentir campanillas dentro del oído) u otras alteraciones auditivas; dolor ocular; visión borrosa; alucinaciones; confusión; aumento de presión arterial; calambres; dolor de cabeza severo; irritación de la lengua; calambres musculares; coloración amarilla de piel u ojos; debilidad o cansancio inusual.

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). **No obstante, si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico.** Entre estos pueden presentarse nerviosismo e irritabilidad;

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE  
ACIDO MEFENAMICO COMPRIMIDOS 500MG**

sensación de plenitud; constipación (estreñimiento); apetito disminuido; náuseas o vómitos leves y de corta duración; dolor de cabeza leve a moderado. También se ha reportado vértigos y somnolencia, si a Usted le ocurre, se recomienda no conducir u operar maquinarias que requieran de concentración.

**Si usted nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte a su médico.**

**PRECAUCIONES:**

- Los ancianos son usualmente más sensibles al efecto de los antiinflamatorios no esteroideos que los adultos jóvenes, por lo que se recomienda precaución en su administración en estos casos.
- Administrar con suma precaución en pacientes con enfermedad renal o hepática.

**DOSIS Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: Lo que su médico le indique.**

**MODO DE EMPLEO:** Vía oral úsese este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o con mayor frecuencia de la que su médico le indique.

Para disminuir las molestias de estómago, se puede tomar con alimentos o con un antiácido, o según indique su médico

No se tienda o acueste por un plazo inferior a 30 minutos después de administrado.

Evite ingerir bebidas alcohólicas mientras esté en tratamiento.

**SOBREDOSIS:** En caso de sobredosis pueden aparecer trastornos al sistema nervioso central, como convulsiones y también podrían presentarse problemas gastrointestinales (como dolor estomacal, vómitos, sensación de ardor, etc.), hepáticos y renales. Se ha descrito que también el paciente podría presentar estado de coma.

Si sospecha de una intoxicación o sobredosis, habiendo o no síntomas, Usted debe trasladar al paciente a un centro asistencial cuanto antes.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener lejos del alcance de los niños.**

**Mantener en su envase original, protegido del calor, a menos de 250C.**

**No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.**

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA**

**NO RECOMIENDE ESTÉ MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**