

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**  
**CASENGLICOL POLVO PARA SOLUCION ORAL, EN SOBRE**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su médico.

**1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO**

Casenglicol Polvo para Solución Oral.

**2. COMPOSICIÓN**

Cada sobre con polvo para solución oral contiene:

<b>Composición:</b>	<b>Sobre 17,6 g</b>
<b>Principio activos</b>	
Macrogol 4000	14,97 g
Sulfato sódico anhidro	1,40 g
Bicarbonato de sodio	0,42 g
Cloruro sódico	0,37 g
Cloruro potásico	0,19 g
Bifosfato sódico	0,12 g
<b>Excipientes c.s.:</b>	
Butilhidroxianisol	
Aroma de naranja (Givaudan)	
Acesulfamo de potasio	
Sucralosa	

Contenido de electrolitos en miliequivalentes (mEq/L)

Na <sup>+</sup>	128,09 mEq/L
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	78,85 mEq/L
HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	20,00 mEq/L
Cl <sup>-</sup>	35,48 mEq/L
H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	4,00 mEq/L
K <sup>+</sup>	10,58 mEq/L

Osmolaridad: 252,68 mOs/l

**3. CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA**

Laxante osmótico.

Código ATC: A06AD65

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE CASENGLICOL POLVO PARA SOLUCION ORAL, EN SOBRE

### 4. QUÉ ES CASENGLICOL Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Casenglicol pertenece a un grupo de medicamentos llamados laxantes osmóticos.

Casenglicol es un evacuante intestinal indicado para preparación previa a la colonoscopia, cirugía, radiología y otros exámenes colorrectales y genitourinarios.

En ocasiones se utiliza para el tratamiento del estreñimiento crónico de causa no orgánica que previamente ha sido tratado, sin resultados satisfactorios, con una dieta de alto contenido en agua y un aumento del ejercicio físico diario.

### 5. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR CASENGLICOL.

#### No tome Casenglicol:

- Si es alérgico a los principios activos o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 2).
- Si tiene úlcera gástrica o intestinal
- Si tiene retención gástrica
- Si tiene una enfermedad intestinal crónica, íleo o megacolon
- Si presenta una obstrucción intestinal.
- Si tiene una perforación intestinal.

### 6. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Casenglicol.
- Debe vigilarse la administración de Casenglicol especialmente cuando se realice mediante sonda nasogástrica, para evitar la regurgitación o aspiración de la solución, especialmente en pacientes con reflejo de deglución dañado, reflujo gastroesofágico o en estado de semiinconsciencia o inconsciencia.
- Si se presenta dolor abdominal. En tal caso, la administración se realizará más lentamente o, incluso, se interrumpirá hasta la reversión de los síntomas.
- Si se sospecha la existencia de obstrucción o perforación gastrointestinal, se deben llevar a cabo las exploraciones diagnósticas necesarias antes de la administración de Casenglicol.
- Cuando se administre Casenglicol en pacientes con colitis severa o proctitis debiéndose emplearse con precaución.
- Si padece un dolor abdominal o una hemorragia rectal repentinos al tomar Casenglicol para la preparación intestinal, póngase en contacto con su médico o acuda a un médico de inmediato.

#### Casenglicol contiene sodio y potasio

Consulte con su médico o farmacéutico si necesita Casenglicol o más de 1 sobre diario por un período prolongado especialmente si le han recomendado una dieta baja en sal (sodio).

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE CASENGLICOL POLVO PARA SOLUCION ORAL, EN SOBRE

Los pacientes con insuficiencia renal o con dietas pobres en potasio deben tener en cuenta que este medicamento contiene 0,4g (10,58mmol) de potasio por litro de solución.

### 7. TOMA DE CASENGLICOL CON OTROS MEDICAMENTOS

Comuníquese a su médico o farmacéutico que está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

La medicación administrada durante la utilización de Casenglicol podría eliminarse por el tracto gastrointestinal y no absorberse.

### 8. EMBARAZO Y LACTANCIA

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No existe experiencia de utilización de Casenglicol durante el embarazo y la lactancia.

Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Casenglicol durante el embarazo y la lactancia.

### 9. CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS

No ha sido descrito.

### 10. CÓMO TOMAR CASENGLICOL

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Casenglicol se tomará disolviendo el contenido de cada sobre de 17,6g en 250ml de agua potable.

La dosis recomendada es:

Para la evacuación intestinal con fines diagnósticos o cirugía:

#### **Adultos:**

Sobres de 17.6 g: La dosis completa es de 16 sobres de 17.6 g.

Disolver el contenido de un sobre en 250 ml de agua.

#### **Niños:**

No hay datos disponibles.

La solución se administra normalmente por vía oral. Se recomienda administrar a razón de 200 a 250 ml cada 10-15 minutos, hasta que la totalidad del volumen haya sido ingerido o la deposición sea clara.

No se debe tomar ningún alimento durante las 3 o 4 horas anteriores a la administración de la solución y en ningún caso se ingerirá alimento sólido las 2 horas anteriores a la utilización de la misma.

En pacientes incapaces de beber la solución se podrá utilizar sonda nasogástrica a razón de 20-30 ml por minuto.

El movimiento intestinal ocurrirá aproximadamente después de una hora de haber iniciado el tratamiento.

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE CASENGLICOL POLVO PARA SOLUCION ORAL, EN SOBRE

Para el tratamiento del estreñimiento crónico de causa no orgánica:

**Adultos:** La dosis recomendada es 250-500 ml por día de la solución reconstituida a partir de un sobre de 17,6g en 250ml de agua. Cuando no esté utilizando Casenglicol puede conservar la solución en refrigerador (entre 2°C y 8°C) y desecharla a las 48 horas después de su preparación.

**Insuficiencia renal:** No es necesario un ajuste de dosis.

**Insuficiencia hepática:** No es necesario un ajuste de dosis.

**Ancianos:** La pauta posológica es la misma que para adultos.

**Duración del tratamiento:** como para todos los laxantes no se recomienda un uso prolongado de Casenglicol.

No utilizar Casenglicol durante más de seis días sin consultar con su médico.

Administrar de forma aislada, cuando se necesite evacuación intestinal profunda.

### **Si toma más Casenglicol del que debiera**

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico.

### **Si olvidó tomar Casenglicol**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

## **11. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Al igual que todos los medicamentos, Casenglicol puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los efectos adversos más habituales son náuseas, sensación de plenitud abdominal y retortijones. En menor medida, pueden presentarse vómitos, calambres abdominales e irritación anal.

Todas estas reacciones adversas son transitorias y ceden rápidamente.

Han sido descritos algunos casos aislados de urticaria, rinorrea, dermatitis, originados por reacciones alérgicas.

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este folleto.

## **12. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Mantener lejos del alcance de los niños.

Guardar en su envase original. Almacenar a no más de 25°C.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE  
CASENGLICOL POLVO PARA SOLUCION ORAL, EN SOBRE**

Cuando no esté utilizando Casenglicol puede conservar la solución en refrigerador (entre 2°C y 8°C) y desecharla a las 48 horas después de su preparación.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No utilice Casenglicol si observa deterioro en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**