

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**  
**DIGOXINA COMPRIMIDOS 0,25 mg**

**Nombre:** Digoxina comprimidos 0,25 mg

**Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.**

**Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.**

**1.- COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:**

Cada comprimido contiene:

<b>Digoxina</b>	<b>0,25 mg</b>
-----------------	----------------

**Excipientes:** celulosa microcristalina, talco, almidón de maíz, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, colorante FD&C rojo N°3, laca alumínica, povidona, lactosa monohidrato.

**2.- VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** oral

**3.- CLASIFICACIÓN:** Cardiotónico

**4.- RECOMENDACIONES DE USO:** para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva y algunas arritmias.

**5.- ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico.

Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:

a) **Alergias:** Ud. debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado alguna reacción alérgica a este medicamento o a alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes y otros medicamentos.

Este medicamento contiene lactosa, precaución en pacientes diabéticos.

b) **Embarazo:** La Digoxina atraviesa la placenta, por lo tanto debe informar a su médico si está embarazada o tiene sospechas de estarlo.

c) **Lactancia:** La Digoxina se distribuye en la leche materna, por lo tanto debe informar a su médico si está amamantando, para que él evalúe si puede consumir este medicamento.

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE DIGOXINA COMPRIMIDOS 0,25 mg

- d) Niños: en niños la respuesta es variable, por lo que se requiere un cuidadoso ajuste de dosis.
- e) Ancianos: pueden tener un mayor riesgo de toxicidad.

### 6.- CONTRAINDICACIONES:

Este medicamento no debe ser usado en pacientes que presenten algunas de las siguientes afecciones, excepto si su médico lo indica.

- Sensibilidad a la droga o a otros digitálicos.
- Taquicardia o fibrilación ventricular.
- Bloqueo aurículo-ventricular completo y en 2° grado, parasinusal, bradicardia sinusal excesiva.

### 7.- INTERACCIONES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de:

Amiodarona; bloqueadores beta-adrenérgicos (Atenolol, Carvedilol, Metoprolol, y Propranolol); bloqueadores de los canales de calcio, especialmente Verapamilo; diuréticos depletos de Potasio; Propafenona; Quinidina o simpaticomiméticos.

### 8.- PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos.

Ud. debe comunicar a su médico si padece alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes:

Cor pulmonale agudo, Síndrome de Wolf-Parkinson-White, bloqueo AV, desórdenes electrolíticos, insuficiencia cardíaca asociada a disfunción diastólica.

### 9.- EFECTOS ADVERSOS: (NO DESEADOS)

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

Latido débil o irregular, palpitaciones, desfallecimiento.

Ansiedad, apatía.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE  
DIGOXINA COMPRIMIDOS 0,25 mg**

Confusión, alucinaciones, alteraciones visuales, dolor de cabeza, depresión mental, dolor abdominal, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, vómitos.

En raras ocasiones también se puede presentar rash cutáneo y trombocitopenia.

Con el uso prolongado se puede producir ginecomastia.

En niños puede producir arritmias y, en forma menos frecuente: ansiedad, apatía, alteraciones visuales, confusión, alucinaciones, dolor de cabeza, depresión mental, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, vómitos.

Si Ud. nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte con el médico.

**10.- FORMA DE ADMINISTRACIÓN:**

Tome exactamente lo que su médico le ha recetado. No tome más ni menos de la dosis prescrita. Tome el medicamento cada día a la misma hora para mantener el efecto terapéutico.

Si olvida una dosis, tómela apenas lo recuerde si es dentro de las 12 horas siguientes a la dosis planificada. No lo haga si lo recuerda después. No duplique la dosis. Consulte con su médico si olvida tomar el medicamento por 2 días o más.

**11.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad.

No usar este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.**

**No recomiende este medicamento a otra persona.**