

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE IVAREST CREMA TÓPICA

Uso tópico

Condición de venta: Directa en establecimientos A y B.

Clasificación: Antihistamínico de uso tópico (Uso externo).

Disponible en envases de 35g

**Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.**

### **COMPOSICIÓN:**

Cada 100 g de crema contiene:

Calamina 14,0 g

Difenhidramina clorhidrato 2,0 g

Excipientes: macrogol 400, alcohol bencílico, petrolato, propilenglicol, aceite de lanolina, poligliceril-3 diisosteato, bentonita, hietelosa, polividona k-30, estearato de sorbitán, silicato de aluminio y magnesio, mentol racémico, óxido de hierro amarillo en aceite de ricino, petrolato y alcohol de lanolina, polisorbato 60, alcanfor, cloruro de benzetonio, colorante FD&C amarillo N°5, óxido de hierro negro, colorante D&C rojo N°33, colorante FD&C amarillo N°6, agua purificada c.s.

### **1.- ¿PARA QUÉ SE USA?**

Ivarest crema se utiliza para el alivio temporal de la picazón provocada por picaduras de insectos (zancudos, mosquitos, abejas, etc.), plantas urticantes (ortiga, entre otras) e irritaciones menores de la piel.

### **2.- ADMINISTRACIÓN (TÓPICA)**

- Rango y frecuencia:  
Se debe aplicar 3 a 4 veces al día **sobre la zona afectada.**
  
- Consejo de cómo administrarlo:  
Debe limpiar la zona afectada y luego aplicar el medicamento.  
Debe lavar sus manos antes de aplicar este producto.  
**No usar con mayor frecuencia a la señalada.**
  
- Uso prolongado:  
Sólo debe utilizar el medicamento hasta el alivio de los síntomas.  
**Debe evitarse el uso por períodos prolongados de tiempo o en áreas extensas del cuerpo.**

### **3.- PRECAUCIONES**

- Mayores de 60 años  
No existe recomendación especial para los ancianos.

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE IVAREST CREMA TÓPICA

- Manejo de vehículos  
Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.
- Embarazo  
Este medicamento puede ser absorbido por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.
- Lactancia  
Este medicamento puede ser absorbido por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.
- Lactantes y niños  
El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.
- Precauciones especiales  
Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.  
No debe aplicar este medicamento en los ojos, mucosas como dentro de la nariz, la boca, en la zona genital y /o anal.  
No debe aplicar difenhidramina — calamina **sobre piel dañada, con heridas, ampollas o sobre superficies que presenten sangramiento.**  
**Mientras esté utilizando IVAREST, no usar otros productos que contengan difenhidramina.**

#### 4.- USTED NO DEBE USAR ESTE MEDICAMENTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Si ha presentado síntomas de alergia a difenhidramina y / o calamina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

**No usar en el tratamiento de peste cristal o varicela, sarampión o quemaduras solares.**

#### 5.- INTERACCIONES

- Medicamentos  
Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

#### 6.- EFECTOS ADVERSOS

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico:

Inflamación, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo, consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

#### 7.- SOBREDOSIS

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos.

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE IVAREST CREMA TÓPICA

Los niños son más sensibles a los efectos de los medicamentos y pueden presentar intoxicación por sobredosis caracterizada por: **agitación, desorientación, confusión, alucinaciones visuales y auditivas, comportamiento extraño, ataxia, nerviosismo y dilatación de pupilas.**

**En esos casos, discontinuar la aplicación del medicamento, lavar con abundante agua y acudir a un centro asistencial** para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

### **8.-CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento por más de 1 semana sin consultar antes con el médico.**

No recomiende este medicamento a otra persona.

**Fecha última actualización: 12-02-2025**