

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE IVAREST CREMA TÓPICA

Uso tópico

Condición de venta: Directa en establecimientos A y B.

Clasificación: Antihistamínico de uso tópico (Uso externo).

Disponibile en envases de 35g

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g de crema contiene:

Calamina 14,0 g

Difenhidramina clorhidrato 2,0 g

Excipientes: macrogol 4, alcohol bencílico, petrolato, propilenglicol, aceite de lanolina, poligliceril-3 diisosteato, bentonita, hietelosa, polividona k-30, estearato de sorbitán, silicato de aluminio y magnesio, mentol racémico, petrolato y alcohol de lanolina, polisorbato 60, óxido de hierro amarillo en aceite de ricino, alcanfor, cloruro de benzetonio, colorante FD&C amarillo N°5, óxido de hierro negro, colorante D&C rojo N°33, colorante FD&C amarillo N°6, agua purificada c.s.

1.- ¿PARA QUÉ SE USA?

Ivarest crema se utiliza para el alivio temporal de la picazón provocada por picaduras de insectos (zancudos, mosquitos, abejas, etc.), plantas urticantes (ortiga, entre otras) e irritaciones menores de la piel.

2.- ADMINISTRACIÓN (TÓPICA)

- Rango y frecuencia:
Se debe aplicar 3 a 4 veces al día **sobre la zona afectada.**

- Consejo de cómo administrarlo:
Debe limpiar la zona afectada y luego aplicar el medicamento.
Debe lavar sus manos antes de aplicar este producto.
No usar con mayor frecuencia a la señalada.

- Uso prolongado:
Sólo debe utilizar el medicamento hasta el alivio de los síntomas.
Debe evitarse el uso por períodos prolongados de tiempo o en áreas extensas del cuerpo.

3.- PRECAUCIONES

- Mayores de 60 años
No existe recomendación especial para los ancianos.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE IVAREST CREMA TÓPICA

- Manejo de vehículos
Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.
- Embarazo
Este medicamento puede ser absorbido por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.
- Lactancia
Este medicamento puede ser absorbido por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.
- Lactantes y niños
El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.
- Precauciones especiales
Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.
No debe aplicar este medicamento en los ojos, mucosas como dentro de la nariz, la boca, en la zona genital y /o anal.
No debe aplicar difenhidramina — calamina **sobre piel dañada, con heridas, ampollas o sobre superficies que presenten sangramiento.**
Mientras esté utilizando IVAREST, no usar otros productos que contengan difenhidramina.

4.- USTED NO DEBE USAR ESTE MEDICAMENTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Si ha presentado síntomas de alergia a difenhidramina y / o calamina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

No usar en el tratamiento de peste cristal o varicela, sarampión o quemaduras solares.

5.- INTERACCIONES

- Medicamentos
Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

6.- EFECTOS ADVERSOS

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico:

Inflamación, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo, consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7.- SOBREDOSIS

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE IVAREST CREMA TÓPICA

Los niños son más sensibles a los efectos de los medicamentos y pueden presentar intoxicación por sobredosis caracterizada por: agitación, desorientación, confusión, alucinaciones visuales y auditivas, comportamiento extraño, ataxia, nerviosismo y dilatación de pupilas.

En esos casos, **discontinuar la aplicación del medicamento, lavar con abundante agua y acudir a un centro asistencial** para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento por más de 1 semana sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.