

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
NODUTAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 25 MG
EXEMESTANO**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquiera duda o no está segura de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

1. QUÉ CONTIENEN LOS COMPRIMIDOS DE NODUTAX

Cada comprimido contiene:

| | |
|-------------|-------|
| Exemestano | 25 mg |
| Excipientes | c.s. |

Excipientes: Manitol, hipromelosa, crospovidona, polisorbato 80, celulosa microcristalina, glicolato sódico de almidón de papa tipo A, estearato de magnesio, sílice coloidal anhidro, croscarmelosa, maltodextrina, glucosa monohidrato, dióxido de titanio, ácido esteárico, óxido de hierro amarillo.

2. INDICACIÓN:

Adyuvante en el tratamiento de cáncer de mama temprano positivo a receptores de estrógeno en mujeres postmenopáusicas quienes han recibido dos o tres años de tratamiento con Tamoxifeno y se les cambia a Exemestano para completar 5 años consecutivos de terapia adyuvante.

3. PRECAUCIONES ANTES DE COMENZAR A TOMAR NODUTAX

No debe tomar Exemestano 25 mg si usted:

- Es o ha sido previamente alérgico (hipersensible) a Exemestano o a algún otro ingrediente de la formulación del producto.
- Todavía no ha pasado por la menopausia, por ejemplo si usted aún tiene periodos.
- Si está en tratamiento con productos que contengan estrógeno, por ejemplo sustitución hormonal para tratar molestias del climaterio
- Está embarazada o quiere quedar embarazada
- Está amamantando

Informe a su médico si usted está en alguno de los casos arriba mencionados.

Tome especial cuidado con Exemestano 25 mg su usted:

- Tiene problemas con sus riñones o hígado, informe a su medico
- Tiene historia o está sufriendo de cualquier condición la cual afecta la fuerza de sus huesos. Su médico podría medir su densidad ósea antes y durante el tratamiento de exemestano

Precauciones con otros medicamentos: Los siguientes medicamentos pueden ser utilizados cuidadosamente cuando toma exemestano. Dé a conocer a su médico si usted está tomando medicamentos tales como:

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
NODUTAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 25 MG
EXEMESTANO**

- Rifampicina (un antibiótico)
- Carbamazepina o Fenitoína
- Hierba de San Juan o preparaciones que la contengan.

Comuníquese a su médico o farmacéutico si usted toma o está tomando recientemente cualquier otro medicamento, incluyendo medicamentos sin receta.

4. COMO TOMAR EXEMESTANO 25 MG

Tome exemestano exactamente como su médico se lo ha indicado. Se recomienda tomarlo después de las comidas y a la misma hora todos los días.

Usted deberá revisar con su médico o químico farmacéutico si usted no está seguro de tomar el medicamento.

Adultos y ancianos

La dosis recomendada es de un comprimido de 25 mg una vez al día. Si necesita ir al hospital mientras toma Exemestano, dé a conocer al equipo médico que medicamentos está tomando.

Niños

Exemestano no está indicado para ser utilizado en niños.

Si usted toma más Exemestano 25 mg de lo que debería o si alguien accidentalmente tomó sus comprimidos, contacte a su médico, farmacéutico u hospital para avisar inmediatamente. Muestre el envase de este medicamento. Si olvidó tomar una dosis, pero se acuerda poco después, tome la dosis diaria en forma habitual. No tomar una dosis doble. Si olvida en varias ocasiones tomar su dosis diaria informe a su médico.

5. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Como todos los medicamentos, Exemestano puede causar efectos secundarios, aunque no todos los pacientes pueden presentarlos. La mayoría de los efectos secundarios son de leves a moderados. Los efectos secundarios más comunes son sofocos, náuseas, fatiga, mayor sudoración y aumento de apetito. Algunos de estos efectos adversos, tales como sofocos (bochornos) pueden ser debidos a la falta de estrógenos en su cuerpo.

Puede ocurrir inflamación del hígado (hepatitis). La sintomatología incluye malestar generalizado, náuseas, ictericia (ojos y piel de color amarillo), picazón, dolor del lado abdominal derecho y pérdida de apetito. Contáctese inmediatamente con su médico si usted cree tener algunos de estos síntomas.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
NODUTAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 25 MG
EXEMESTANO**

Otros efectos adversos: dificultad para dormir, dolor de cabeza, sensación de enfermedad, dolor de articulaciones y muscular (incluyendo inflamación de articulaciones, dolor de espalda y rigidez de articulaciones), cansancio, depresión, mareos, entumecimiento y dolor que afecta a toda la mano excepto al dedo meñique (síndrome del túnel carpiano), constipación, indigestión, diarrea.

6. COMO ALMACENAR NODUTAX

Mantenga fuera del alcance y vista de los niños.

Mantener en lugar fresco y seco a menos de 25°C.

No use este medicamento después de la fecha de expira ubicada en la parte externa del estuche y sobre cada blíster.