

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**  
**SIAFIL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 mg**

Lea este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral

**COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:**

Cada comprimido contiene:

Sildenafil citrato 140,44 mg

(equivalente a 100 mg de sildenafil)

Excipientes c.s.

Excipientes: Celulosa microcristalina, fosfato de calcio dibásico anhidro, lactosa monohidrato, polividona, estearato de magnesio, talco purificado, croscarmelosa sódica, dióxido de silicio coloidal, hipromelosa, dióxido de titanio, colorante FD&C azul N°1

**Presentación:** Envase con 1, 2, 3 y 4 comprimidos recubiertos.

**INDICACIONES:**

Tratamiento de la disfunción eréctil.

**CLASIFICACIÓN:**

Inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 — Disfunción eréctil

Agente sistémico para la impotencia masculina.

**ADVERTENCIAS:**

Es importante advertir a los pacientes que el uso del medicamento no protege contra enfermedades de transmisión sexual (incluido HIV) y por lo tanto deberá tomarse las medidas protectoras necesarias.

Este medicamento no estimula el deseo sexual y no afecta la fertilidad.

Úsese sólo por indicación médica. No aumentar la dosis a una dosificación superior, ni exceder la dosis diaria.

Mantener fuera del alcance de los niños.

**CONTRAINDICACIONES:**

No usar en personas sensibles al fármaco.

No usar en niños ni adolescentes.

Si usted está siendo tratado con medicamentos que contienen nitritos o aportan óxido nítrico, tales como nitroglicerina, nitrito de amilo, isosorbide dinitrato y mononitrato, tetranitrato de eritrilo, nitroprusiato de sodio, no debe tomar este medicamento, dado el riesgo de hipotensión arterial severa.

**PRECAUCIONES:**

No se recomienda el uso conjunto con otros medicamentos para la impotencia, salvo indicación del médico.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**  
**SIAFIL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 mg**

Usese con precaución en pacientes con ciertas enfermedades o condiciones: deformaciones anatómicas o enfermedades del pene, úlcera péptica activa, alteraciones cardíacas, pacientes con antecedentes de priapismo.

**INTERACCIONES:**

Informe a su médico de todos los medicamentos que está tomando, incluso aquellos sin receta.

Si usted está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos, comuníquelos a su médico: otros fármacos para la impotencia, nitratos o sustancias que aportan óxido nítrico. nitroglicerina, antihipertensivos, cimetidina, eritromicina, itraconazol, ketoconazol, mibefradil.

Este medicamento puede producir interacciones con los fármacos antes mencionados.

**EFFECTOS INDESEABLES:**

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: dolor de cabeza, rubor, dispepsia, congestión nasal, trastornos visuales, diarrea, vértigo, rash cutáneo.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto, acuda a un médico: infecciones del tracto urinario, alteraciones cardíacas (taquicardia), alergia generalizada.

**DOSIS:** Lo que su médico le indique.

**MODO DE EMPLEO:**

Este medicamento se toma con un vaso con agua, Sin masticarlo, una hora antes de la actividad sexual y de preferencia alejado de las comidas sobre todo Si éstas contienen alimentos grasos. Sin embargo, puede tomarse también en cualquier momento entre 4 horas y hasta media hora previo a la actividad sexual.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Mantener en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.