

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE SIAFIL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 50 mg

Lea este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Cada comprimido contiene:

Sildenafil citrato 70,22 mg

(equivalente a 50 mg de sildenafil)

Excipientes c.s.

Excipientes: Celulosa microcristalina, fosfato de calcio dibásico anhidro, lactosa monohidrato, polividona, estearato de magnesio, talco purificado, croscarmelosa sódica, dióxido de silicio coloidal, hipromelosa, dióxido de titanio, colorante FD&C azul N°1

Presentación: Envase con 1, 2, 3 y 4 comprimidos recubiertos.

INDICACIONES:

Tratamiento de la disfunción eréctil.

CLASIFICACIÓN:

Inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 — Disfunción eréctil

Agente sistémico para la impotencia masculina.

ADVERTENCIAS:

Es importante advertir a los pacientes que el uso del medicamento no protege contra enfermedades de transmisión sexual (incluido HIV) y por lo tanto deberá tomarse las medidas protectoras necesarias.

Este medicamento no estimula el deseo sexual y no afecta la fertilidad.

Úsese sólo por indicación médica. No aumentar la dosis a una dosificación superior, ni exceder la dosis diaria.

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

No usar en personas sensibles al fármaco.

No usar en niños ni adolescentes.

Si usted está siendo tratado con medicamentos que contienen nitritos o aportan óxido nítrico, tales como nitroglicerina, nitrito de amilo, isosorbide dinitrato y mononitrato, tetranitrato de eritritilo, nitroprusiato de sodio, no debe tomar este medicamento, dado el riesgo de hipotensión arterial severa.

PRECAUCIONES:

No se recomienda el uso conjunto con otros medicamentos para la impotencia, salvo indicación del médico.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
SIAFIL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 50 mg

Usese con precaución en pacientes con ciertas enfermedades o condiciones: deformaciones anatómicas o enfermedades del pene, úlcera péptica activa, alteraciones cardíacas, pacientes con antecedentes de priapismo.

INTERACCIONES:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está tomando, incluso aquellos sin receta.

Si usted está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos, comuníquelos a su médico: otros fármacos para la impotencia, nitratos o sustancias que aportan óxido nítrico. nitroglicerina, antihipertensivos, cimetidina, eritromicina, itraconazol, ketoconazol, mibefradil.

Este medicamento puede producir interacciones con los fármacos antes mencionados.

EFFECTOS INDESEABLES:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: dolor de cabeza, rubor, dispepsia, congestión nasal, trastornos visuales, diarrea, vértigo, rash cutáneo.

REACCIONES ADVERSAS:

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto, acuda a un médico: infecciones del tracto urinario, alteraciones cardíacas (taquicardia), alergia generalizada.

DOSIS: Lo que su médico le indique.

MODO DE EMPLEO:

Este medicamento se toma con un vaso con agua, Sin masticarlo, una hora antes de la actividad sexual y de preferencia alejado de las comidas sobre todo Si éstas contienen alimentos grasos. Sin embargo, puede tomarse también en cualquier momento entre 4 horas y hasta media hora previo a la actividad sexual.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.