

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE SICADOL FORTE COMPRIMIDOS 500 mg

Les cuidadosamente este folle antes de la administración de este medicamento. Contiene información acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier dudo o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

### COMPOSICIÓN:

Cada comprimido contiene:

Ácido mefenámico 500,0 mg

Excipientes: Croscarmelosa sódico, povidona, laurilsulfato de sodio, talco.

### ¿PARA QUÉ SE USA?

Este medicamento está indicado para el alivio de dolores leves a moderados.

Para aliviar dolores menstruales.

### ADMINISTRACIÓN (ORAL)

Este medicamento debe ser recetado por un médico, el cual le indicará la dosis y forma de administración más adecuada para su tratamiento. Lo recomendado es usar una dosis de 500 mg. Seguido de 250 mg cada 6 horas, por un periodo de 2 a 3 días en el caso de dismenorrea.

Debe tomar el medicamento en conjunto con comidas para disminuir posibles molestas estomacales.

No debe utilizar el medicamento por más de 7 días seguidos, a menos que su médico indique lo contrario.

El uso prolongado de este medicamento puede provocar úlceras estomacales, por lo que debe estar bajo supervisión y control periódico de su médico.

### PRECAUCIONES

Mayor de 60 años

Los problemas estomacales pueden ser más severos en pacientes mayores de 60 años.

Este medicamento no está recomendado en pacientes con insuficiencia renal, así como otros AINES.

Consumo de alcohol

Debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento, ya que existe riesgo de provocar problemas gastrointestinales.

Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE SICADOL FORTE COMPRIMIDOS 500 mg

### Embarazo

Puede utilizar ácido Mefenámico el tercer trimestre del embarazo, bajo indicación y control de su médico.

### Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

### Lactantes y niños

No debe utilizar ácido Mefenámico en niños menores de 12 años, en el caso de utilizarlo no se debe prolongar el tratamiento por más de una semana, a menos que su pediatra indique lo contrario.

### Precauciones especiales

Este tipo de medicamentos interfiere en la coagulación de la sangre, por lo que se recomienda que usted deje de tomarlo por lo menos tres días antes de someterse algún tipo de cirugía. Debe evitar exponerse al sol durante el tratamiento con este medicamento, ya que puede aumentar el riesgo de quemaduras u otras reacciones de la piel. Usted debe consultar a su médico antes de usar este medicamento si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca).

Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

### **USTED NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

- Si ha presentado alergias a este u otro medicamento como ácido acetilsalicílico (aspirina), u otros antiinflamatorios similares.
- Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación
- Si padece de úlcera estomacal o a sufrido hemorragias gastrointestinales recientes
- No debe usar este medicamento en el periodo inmediato a un bypass coronario

### **INTERACCIONES**

#### Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos: antiácidos, warfarina, ciclosporina, sales de litio, digoxina, fenitoína, ácido valproico, quinolonas, probenecid y ketoconazol.

#### Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE SICADOL FORTE COMPRIMIDOS 500 mg

medicamento, si padece de úlceras en el estómago o intestinos, diabetes mellitus, lupus eritematoso, sistémico, anemia, asma, epilepsia, enfermedad de Parkinson, cálculos renales, o alcoholismo.

### Exámenes de laboratorio

El consumo de este medicamento puede producir alteraciones en algunos exámenes de sangre y orina, por lo que debe consultar cuanto tiempo antes de efectuarse dicho examen debe dejar de tomar el medicamento.

### EFFECTOS ADVERSOS

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para respirar, con o sin adormecimiento de las piernas, dolor en el pecho, diarrea o vómitos con sangre, melena, dolor de estomago intenso, disminución de la cantidad de orina o en la frecuencia para orinar, enrojecimiento o ampollas en la piel.

### Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: náuseas, vómitos, diarrea, constipación, dolor de cabeza. Vértigo, somnolencia, tintineo en los oídos, inusuales temblores o entumecimiento de las manos o los pies, visión azul rojiza.

### SOBREDOSIS

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos, dolor de cabeza severo, confusión y mal estar. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.