

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

URICONT COMPRIMIDOS 5 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Uricont comprimidos 5mg

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN

Cada comprimido contiene:

Oxibutinina clorhidrato 5 mg

Excipientes: Croscarmelosa sódica, almidón de maíz, sacarosa, ácido tartárico, colorante FD&C azul N°1, talco, estearato de magnesio, lactosa monohidrato c.s.p.

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimidos

VIA DE ADMINISTRACIÓN

Vía Oral

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA

Antiespasmódico selectivo del tracto urinario.

INDICACIONES

Uricont está indicado para el alivio de los síntomas asociados con la incontinencia urinaria en pacientes con vejiga no inhibida, y vejiga neurogénica refleja, estas son la enuresis nocturna, tratamiento sintomático de disuria, urgencia miccional, nicturia.

POSOLOGÍA

Adultos: La dosis usual son 2 a 3 comprimidos al día. La dosis máxima recomendada es de 4 comprimidos al día.

Niños mayores de 5 años: La dosis usual son 2 comprimidos al día. La dosis máxima recomendada son 3 comprimidos al día.

CONTRAINDICACIONES

Oxibutinina está contraindicado en pacientes con glaucoma, en obstrucción parcial o completa del tracto gastrointestinal, íleo paralítico, atonía intestinal en pacientes debilitados, megacolon, colitis ulcerativas, miastenia gravis y uropatía obstructiva.

Embarazo y lactancia: Este medicamento no debe ser usado durante el embarazo, a menos que sea estrictamente necesario e indicado por el médico. No se sabe si la droga es excretada en la leche materna, por tanto este medicamento no debe ser usado en periodo de lactancia.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE URICONT COMPRIMIDOS 5 mg

Niños: No administrar a niños menores de 5 años

Ancianos: Este fármaco debe ser usado con precaución en pacientes de edad avanzada.

ADVERTENCIAS:

Este medicamento debe ser usado con precaución en pacientes con procesos neurológicos importantes y con enfermedad hepática o renal.

Si se administra en presencia de fiebre puede causar aumento de la temperatura porque produce disminución de la sudoración.

INTERACCIONES

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacción). Es muy importante que consulte con el farmacéutico o el médico la conveniencia de usar este medicamento si está tomando otros.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos anticolinérgicos o que tengan efectos tipo anticolinérgicos (por ejemplo, antiespasmódicos, fenotiazinas) provocando mayor intensidad de los efectos adversos; con medicamentos depresores del sistema nervioso central y con alcohol puede provocar mayores efectos sedantes y somnolencia.

PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES

La administración de este medicamento a pacientes con colitis ulcerativa puede suprimir la motilidad intestinal hasta el punto de producir íleo paralítico, agravándose a megacolon tóxico, que es una seria complicación de esta enfermedad.

CAPACIDAD DE CONDUCIR O MANEJAR MAQUINARIA PELIGROSA

Este medicamento puede producir somnolencia o visión borrosa, por lo tanto, los pacientes que necesitan realizar actividades que requieren alerta mental o coordinación física, como conducir un vehículo motorizado u otra maquinaria, no deben tomar este fármaco.

PRECAUCIONES

Si el paciente presenta somnolencia o visión borrosa, no deberá conducir vehículo ni manejar maquinarias o participar en actividades que requieran concentración

EFFECTOS ADVERSOS (no deseados)

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados especialmente si se toman por un periodo prolongado y/o en dosis grandes.

Si aparecen cualesquiera de los síntomas siguientes deje de tomar el medicamento y consulte al médico: retención urinaria, visión borrosa, fiebre, taquicardia, midriasis, aumento de la presión intraocular, reacción alérgica con rash y prurito generalizado.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
URICONT COMPRIMIDOS 5 mg

Otros efectos tales como sequedad de boca, disminución de la sudoración, palpitaciones, vasodilatación, disminución de la lacrimación, debilidad, insomnio, náuseas, vómitos, constipación y reacciones alérgicas en personas susceptibles, en general no requieren de atención médica.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Guardar en su envase original, protegido del calor, luz y de la humedad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona