

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE  
BLISTEX CON MEDICACIÓN CREMA LABIAL**

**Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente**

**Composición**

Cada 100 g de crema contiene: Fenol (90%) 0.45 g, Alcanfor 1.00 g.

Excipientes: aceite mineral, cera de abejas blanca, parafina, vaselina blanca, lanolina anhidra, triglicerol diisoestearato, SD alcohol 36, glicerina, estearoil lactilato de calcio, saborizante de menta, dióxido de silicio, salicilato de metilo, cristales de mentol, monoestearato de glicerilo, alcohol cetílico, hidróxido de amonio, hidróxido de calcio, sacarina sódica, agua purificada.

**Indicación**

Antiséptico de uso externo. Alivia herpes labiales, queilitis, labios partidos, resecos y quemados por el sol, el frío, el viento o la nieve. Útil en la prevención y alivio de labios partidos y resecos.

**Contraindicaciones**

Debido a la presencia de alcanfor, no usar en lactantes o menores de 7 años.

No usar si es alérgico a cualquiera de los componentes.

**Advertencias y precauciones**

Evitar el contacto con los ojos. Si no se produce alivio o aparece alguna reacción alérgica, discontinue su uso y consulte al médico. Sólo para uso externo.

Debido a la presencia de Alcanfor, no debe usarse este producto en lactantes o niños menores de 7 años.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Modo de uso**

Uso tópico. Aplique Blistex directamente sobre los labios.

Labios partidos y resecos: Use Blistex cada media hora (o más si es necesario) hasta que sus labios estén suaves y tersos.

Herpes labiales: A la primera señal de fuegos o herpes labiales aplique Blistex masajeando la zona afectada. Repita cada media hora hasta sentir alivio.

Labios quemados y con ampollas: Blistex puede ser aplicado frecuentemente cuando sus labios estén expuestos al sol, viento y frío invernal.

**Efectos adversos**

Los medicamentos pueden producir algún efecto no deseado en adición al que se pretende obtener. Personas sensibles a cualquier componente del producto pueden sufrir alergia, si esto sucede, discontinue el uso y consulte a su doctor.

**Synthon**  
Reg. ISP N°F-3730

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE  
BLISTEX CON MEDICACIÓN CREMA LABIAL**

**Condiciones de almacenamiento**

Almacenar a no más de 25°C. Mantener lejos del alcance de los niños.

Importado por: Synthon Chile, Ltda. El Castaño 145, Lampa, Santiago – Chile.

Distribuido por Drogería Synthon Chile Ltda. Santa Isabel 585, letra D, Lampa, Santiago – Chile.

Fabricado en EE.UU. por Blistex Inc., Oak Brook, IL 60523 2.