

Synthon

INNOVACIÓN PARA LA SALUD DE TODOS

ADVERTENCIA

Para los pacientes que toman Adeline® (Lenalidomida)

Es importante que Ud. lea la sección de “**Advertencia sobre el embarazo y contraindicaciones**” contenida en el prospecto que se encuentra dentro de su caja de Adeline® (Lenalidomida). Lenalidomida es similar al medicamento Talidomida, por lo que puede causar defectos congénitos graves y potencialmente mortales. Es importante que tenga las siguientes precauciones al momento de iniciar su terapia con Adeline®

IMPORTANTE PARA LAS MUJERES

NO tome Adeline® si está embarazada, está amamantando o si puede quedar embarazada y no está usando al menos 1 método anticonceptivo altamente eficaz y al menos 1 método anticonceptivo eficaz adicional simultáneamente cada vez que tiene relaciones sexuales con un hombre.

IMPORTANTE PARA LOS HOMBRES

Debe usar preservativo **CADA VEZ** que tenga relaciones sexuales con una mujer que esté o pueda quedar embarazada, aun si se ha sometido a vasectomía satisfactoria (ligadura de los conductos para evitar el paso del espermatozoides), **NO** debe donar espermatozoides mientras esté tomando Adeline®, durante los periodos de descanso (interrupción de las dosis) y durante 4 semanas después de dejar de tomar Adeline®.

Esta no es una descripción completa de los riesgos asociados con el uso de Adeline®. Lea el prospecto de Adeline® para obtener más información acerca los riesgos asociados con el uso y consulte la información completa sobre la prescripción.

Synthon Chile, se preocupa por su seguridad. Reporte sus reacciones adversas mediante el formulario electrónico que se encuentra en **www.synthon.cl** o al correo **farmacovigilancia.chile@synthon.com**